



PERIO·AID[®] PROTECT

ПЕРІО-ЕЙД ЗАХИСТ

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР DENTAID

Після проведення процедур у ротовій порожнині важливо мінімізувати можливі наслідки, а також піклуватися про тканини порожнини рота.


DENTAID, провідна лабораторія у галузі здоров'я ротової порожнини, продовжує впроваджувати інновації та розробляє нові рішення для покращення здоров'я порожнини рота.

Дослідницький центр DENTAID – це місце, де наука, досвід та знання об'єднуються з метою пошуку нових рішень для сучасних потреб, тут була розроблена DENTAID technology hyaluronrepair® (технологія ДЕНТЕЙД гіалуронріпар).



DENTAID technology hyaluronrepair® (технологія ДЕНТЕЙД гіалуронріпар) – клінічно випробувана технологія, що базується на використанні гіалуронової кислоти, яка є природним компонентом тканин слизової оболонки ротової порожнини. Це дозволяє формувати захисний шар, що сприяє швидкій регенерації та відновленню пошкоджених тканин.

УНІКАЛЬНА ФОРМУЛА



DENTAID
technology
hyaluronrepair®

▶ 0.20% ХЛОРГЕКСИДИНУ (СНХ)

Найефективніший антисептик, що вважається **золотим стандартом**, з широким спектром антибактеріальної дії. Основне його призначення: запобігання розвитку бактеріального нальоту.

▶ 0.20% ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ

Природний компонент тканин слизової оболонки ротової порожнини, сприяє проліферації та міграції фібробластів та епітеліальних клітин, формує захисний шар, допомагає регенерації пошкоджених тканин та прискорює процес їхнього відновлення.

▶ 5% ПАНТЕНОЛУ

Сприяє зменшенню запалення ясен на ураженій ділянці, а також стимулює регенерацію тканин, сприяючи їхньому відновленню.


Активні речовини препарату забезпечують:






- ▶ **0.20% хлоргексидину** у складі формули забезпечує **АНТИСЕПТИЧНИЙ ЕФЕКТ**: захищає пошкоджені тканини, зменшує утворення бактеріального нальоту у ротовій порожнині, знижує ризик бактеріальної інфекції.

Динаміка росту біоплівки на дисках гідроксиапатиту через 4 дні



* Зображення багатовидових біоплівок, вирощених протягом 4 днів на дисках гідроксиапатиту, зроблене лазерним сканувальним конфокальним мікроскопом

% зменшення біомаси (об'єм бактерій, які не розвинулися)



Препарат зі вмістом 0.20% хлоргексидину + 0.20% гіялуринової кислоти + 5% пантенолу пригнічує ріст оральної біоплівки на 92.4%


Дослідження in vitro, проведене у дослідницькому центрі DENTAID у 2017 р.



▶ Введення **гіалуронової кислоти** до складу препарату сприяє **РЕГЕНЕРАЦІЇ** ясен та слизової оболонки порожнини рота.


Активність клітин слизової оболонки ротової порожнини

Без гелю



Проліферативна активність (Ki-67) у базальному шарі поверхневого епітелію (x40)

Гель зі вмістом 0.20% хлоргексидину + 0.20% гіалуронової кислоти + 5% пантенолу



Проліферативна активність (Ki-67) у базальному шарі та у проміжних шарах поверхневого епітелію (x40)

Коефіцієнт проліферації клітин збільшується у найближчих до поверхні шарах, що означає **більшу здатність до регенерації**.

 Проліферація клітин

Препарат зі вмістом
0.20% хлоргексидину +
0.20% гіалуронової кислоти
+ 5% пантенолу

Сприяє
РЕГЕНЕРАЦІЇ
ушкоджених тканин

Біопсія тканин, які були взяті через 7 днів після операції: без обробки яким-небудь препаратом та оброблені гелем зі вмістом 0.20% хлоргексидину + 0.20% гіалуронової кислоти + 5% пантенолу

*Ki-67: клітинний проліферативний фактор.

Клінічне дослідження під наглядом лікарів-стоматологів, проведене на пацієнтах, яким було видалено нижні треті моляри. 2017 рік.




▶ Введення до складу препарату **ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ та ПАНТЕНОЛУ** сприяє **ВІДНОВЛЕННЮ і ЗАГОЄННЮ** тканин.

Загоєння м'яких тканин ротової порожнини

Аплікації гелем зі вмістом
0.20% хлоргексидину
+ 0.20% гіалуронової кислоти
+ 5% пантенолу після 7 днів використання
забезпечують краще заживання:

- менше грануляційної тканини
- зменшення кровотечі
- кращий колір м'яких тканин



Рейтинг загоєння по категоріях до загальної кількості пацієнтів



Визначення ступеню загоєння відповідно до критерію, описаного Ландрі [Landry] та ін. *

Використання гелю зі вмістом 0.20% хлоргексидину + 0.20% гіалуронової кислоти + 5% пантенолу допомагає **отримати добрі та дуже добрі результати загоєння** порівнюючи з групою, що не застосовувала гель.

▶ Додавання до складу препарату **ПАНТЕНОЛУ** надає **ПРОТИЗАПАЛЬНІ** властивості, що допомагають відновити тканини.

Середній показник загоєння (індекс Ландрі [Landry] – шкала 1-5)
- Група, що застосовувала гель зі вмістом 0.20% хлоргексидину + 0.20% гіалуронової кислоти + 5% пантенолу = 3.85
- Контрольна група = 3.40
p<0.05 статистично значущі відмінності

Клінічне дослідження під наглядом лікарів-стоматологів, проведене на пацієнтах, яким було видалено нижні треті моляри. 2017 рік.

*Ландрі Р.Г., Тернбулл Р.С., Хоулі Т. Ландрі Р.Г., Тернбулл Р.С., Хоулі Т. Ефективність використання бензидаміну гідрохлориду у пацієнтів після хірургічного втручання на тканинах пародонта. Форуми дослідницької клініки 1988; 10:105-118 [Landry RG, Turnbull RS, Howley T. Effectiveness of benzy-damine HCl in the treatment of periodontal post-surgical patients. Res Clinic Forums 1988; 10:105-118]



- ▶ Після будь-якого втручання у ротовій порожнині використання продукту з адгезивною здатністю має важливе значення для захисту тканин.



- ▶ Препарат 0.20% хлоргексидину + 0.20% гіалуронової кислоти + 5% пантенолу створений на полімерній основі, що включає гідроксиетилцелюлозу та гіалуронову кислоту, завдяки чому має **БІОАДГЕЗИВНІ** властивості, що дозволяє утворювати захисне покриття слизової оболонки ротової порожнини.

- ▶ Ефективність місцевого застосування препарату на ділянці, що потребує лікування, тим вища, чим довше активний інгредієнт залишається у контакті з нею; ось чому важливо, щоб рецептура включала речовини, що сприяють адгезії до слизової оболонки.



- ▶ Застосування мукоадгезивної формули збільшує час контакту активних інгредієнтів у зоні дії та забезпечує тривалий ефект.

PERIO·AID® PROTECT

ПЕРІО-ЕЙД ЗАХИСТ

НАУКОВІ
ІННОВАЦІЇ

УНІКАЛЬНА ФОРМУЛА

- ▶ ХЛОРГЕКСИДИН (СНХ) 0.20%
- ▶ ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА
- ▶ ПАНТЕНОЛ

0.20% ХЛОРГЕКСИДИНУ
+ гіалуронова кислота

0.20



МІСЦЕВЕ
ЗАСТОСУВАННЯ

ДІЯ
ЗАСОБУ

0.20%
СНХ



ЗАХИСТ



БІОАДГЕЗИВНІСТЬ

PERIO·AID PROTECT

ПЕРІО-ЕЙД ЗАХИСТ

PERIO·AID®

0.20% ХЛОРГЕКСИДИНУ
+ гіалуронова кислота

0.20

Біoadгезивний гель

- ▶ Допоміжний засіб при стоматологічних процедурах
- ▶ Допомагає зменшити накопичення бактеріального нальоту у порожнині рота
- ▶ Допомагає доглядати та захищати ясна і слизову оболонку ротової порожнини

НОВИНКА



30 мл



PERIO·AID INTENSIVE CARE

ПЕРІО-ЕЙД ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД

PERIO·AID®

0.12% ХЛОРГЕКСИДИНУ
+ хлорид цетилпіридину

0.12

Дентальний гель

- ▶ Після стоматологічного лікування
- ▶ Призначений для людей з надмірним утворенням оральної біоплівки (зубного нальоту)



75 мл



PERIO-AID PROTECT

ПЕРІО-ЕЙД ЗАХИСТ

PERIO-AID®

0.20% ХЛОРГЕКСИДИНУ

+ гіалуронова кислота

НОВИНКА



▶ Захист ясен від дії зовнішніх агресивних факторів

PERIO-AID INTENSIVE CARE

ПЕРІО-ЕЙД ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД

PERIO-AID®

0.12% ХЛОРГЕКСИДИНУ

+ 0.05% хлориду цетилпіридину



▶ Боротьба з бактеріальним нальотом

PERIO-AID ACTIVE CONTROL

ПЕРІО-ЕЙД АКТИВНИЙ КОНТРОЛЬ


PERIO-AID®

0.05% ХЛОРГЕКСИДИНУ

+ 0.05% хлориду цетилпіридину



▶ Активний контроль бактеріального нальоту
▶ Довготривале використання



DENTAID
technology
hyaluronrepair®



PERIO·AID®

Спеціалізоване видання, призначене для медичних закладів, лікарів та інших професійних медичних працівників.

DENTAID

Oral Health Experts

МАТЕРІАЛИ Є ВЛАСНІСТЮ **DENTAID**. ПУБЛІЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗ ДОЗВОЛУ КОМПАНІЇ ЗАБОРОНЕНО.